

SITUATION

Maladies : La Fusariose hivernale est très présente depuis 2 semaines en région parisienne et en Picardie. Le réseau signale les premiers symptômes de *Microdochium nivale* dans le 64-68 et 83 ainsi que sur gazon d'agrément (10). Le dollar spot est toujours bien présent (30-40-64-69 et Corse), ce n'est pas le moment de relâcher la surveillance. Présence de Rhizoctoniose (09-78).

Présence de rouille et d'oïdium dans les roughs (68).

Présence d'helminthosporiose sur gazon à vocation sportive (64).

Ravageurs terricoles : Stade larvaire de **Tipula paludosa** et **T. oleracea** (30) de stade L2-L3 formant un réservoir important de population au printemps, ce n'est pas le moment d'intervenir, elles risquent de migrer dans les horizons profonds du sol dans les prochaines semaines.

Présence de larves de **Hannetons** sur fairways de golf (40-60-64).

Non ravageurs : présence de turricules de vers de terre (64).

| Vos observations : | Groupe 1 BASSIN PARISIEN / Centre / Centre-Est : Île-de- France, Centre, Bourgogne | Groupe 2 NORD- OUEST : Basse- Normandie, Haute- Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire | Groupe 3 NORD-EST : Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Lorraine, Picardie, Franche-Comté, Champagne-Ardenne | Groupe 4 SUD-OUEST : Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Auvergne, Midi- Pyrénées, Pays Basque | Groupe 5 SUD-EST : Rhône- Alpes, PACA, Languedoc- Roussillon, Corse |
|--------------------|---|---|--|---|---|
| Dollar spot | <p style="text-align: center;">Présence de <i>Clariireedia</i> spp (sud de la France) – Risque moyen (tous les types de gazons)</p>  <p style="text-align: center;">Photo : Patrice Bernard</p> | | | | |